

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7010364	ABIMOX	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
6968369	ABRADEL	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
7288046	ACICLOVIR BRILL PHARMA	30 mg/g POMADA OFTÁLMICA 1 TUBO 4,5 g	30 mg/g=3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6684672	ACULAR	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
6752562	ACUOLENS	3 mg/ml + 5,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,5 ml	3 mg/ml=0,3% + 5,5 mg/ml=0,55%	No congelador.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	1 semana tras la apertura del sobre (P).
7236924	AFLUON	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 6 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
7334286	ALERGOFTAL	0,25 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0,25 mg/ml=0,025% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	1 mes tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6537343	ALPHAGAN	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
7321767	AMIRIOX	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	90 días tras su apertura (P).	
7105978	APADIN	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color, olor se enturbia (P).
6501955	ARTEOPTIC	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION LIBERACION PROLONGADA 1 FRASCO 3 ml	20 mg/ml=2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
6502488	ARTEOPTIC	10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION LIBERACION PROLONGADA 1 FRASCO 3 ml	10 mg/ml=1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6649282	ARTEOPTIC	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION LIBERACION PROLONGADA 30 UNIDOSIS 0,2 ml	20 mg/ml=2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	30 días tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
7847021	ARTIFIC	3,2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,5 ml	3,2 mg/ml=0,32%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7847106	ARTIFIC	3,2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	3,2 mg/ml=0,32%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	6 semanas tras su apertura (P).	
6987278	ARZOLAN	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
6987353	ARZOTIM	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		28 días tras su apertura (P).	
6721384	AZARGA	10 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7210740	AZELASTINA ABAMED	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 6 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7068495	AZELASTINA MABO	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 6 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7121992	AZELASTINA POS	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	12 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
8482269	AZOPT	10 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
6603482	AZYDROP	15 mg/g COLIRIO EN SOLUCION 6 MONODOSIS 0,25 g	15 mg/g=1,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7383826	BAPIRI	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 9 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	90 días tras su apertura (P).	
6533048	BENTIFEN	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,25 mg/ml=0,025%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6804704	BETOPTIC	2,5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	2,5 mg/ml=0,25%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7583059	BILAXTEN	6 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	6 mg/ml=0,6%	No congelador. Proteger de luz.		2 meses tras su apertura (P).	
6821206	BILINA	0,5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 4 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
7300434	BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7333487	BIMEOX	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	0,3 mg/ml=0,03%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	30 días tras la apertura del sobre (P).
7419082	BIMI	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 9 ml	0,3 mg/ml=0,03%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	90 días tras su apertura (P).	
6630327	BRIMONIDINA VIATRIS	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador. Proteger de luz.		28 días tras su apertura (P).	
7109297	BRIMONIDINA VIR	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador. Proteger de luz.		28 días tras su apertura (P).	
7223481	BRIMVERA	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,35 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	3 meses tras la apertura del sobre (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7064565	BRINZOLAMIDA STADA	10 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7235583	BRIPIO	2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 60 MONODOSIS 0,35 ml	2 mg/ml=0,2%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	3 meses tras la apertura del sobre (P).
6987490	CARMELOSA QUALIGEN	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
7016373	CARMELOSA STADA	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6805794	CELLUFRESH	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
7334774	CENTILUX	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0,25mg/ml=0,025%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6931745	CETRAFLUX	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,25 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	90 días tras la apertura del sobre (P).
9900519	COLIRCUSI ANTIEDEMA	50 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	50 mg/ml=5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6534458	COLIRCUSI DEXAMETASONA	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	1mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6534373	COLIRCUSI FENILEFRINA	100 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	100 mg/ml=10%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6534700	COLIRCUSI GENTAMICINA	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
6534786	COLIRCUSI PILOCARPINA	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6720950	COLIROFTA ANESTESICO	5 mg/ml + 0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	5 mg/ml =0,5% + 0,5 mg/ml=0,05%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7351429	COLIROFTA ANESTESICO DOBLE	4 mg/ml + 1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	4 mg/ml =1,4% + 1 mg/ml=0,1%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
6548264	COLIROFTA ATROPINA	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	5 mg/ml= 0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6548271	COLIROFTA ATROPINA	10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
000346	FÓRMULA MAGISTRAL ATROPINA 0,01% COLIRIO	0,1mg/ml COLIRIO 1 FRASCO 10 ml	0,1 mg/ml=0,01%	No congelador. Proteger de luz.		1 mes tras su apertura y 3 meses desde fecha de elaboración (P)	
6548257	COLIROFTA CICLOPLEJICO	10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6534526	COLIROFTA FLUOTEST	2,5 mg/ml + 4 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	2,5 mg/ml=0,25% + 4 mg/ml=0,4%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
6534861	COLIROFTA TROPICAMIDA	10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6535110	COMBIGAN	2 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2 mg/ml =0,2%+ 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7163183	COSDUO	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
8407026	COSOPT	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		28 días tras su apertura (P).	
7234449	COSOPT PF	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	2 meses tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
9738839	CUSICROM FUERTE OFTÁLMICO	40 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	40 mg/ml=4%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
9529376	CUSIMOLOL	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml= 0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6541234	DEXAFREE	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,4 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	15 días tras la apertura del sobre (P).
7270812	DEXAMETASONA POS	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6602485	DICLOABAK	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	8 semanas tras su apertura (P).	
6980293	DICLOFENACO ABAMED	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6650677	DICLOFENACO LEPORI	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	1 mes tras su apertura (P).	
6843246	DICLOFENACO LEPORI	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	60 días tras la apertura del sobre (P).
7337546	DIMAZ	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	20 mg/ml=2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Frasco 5ml: 60 días tras su apertura. Frasco 10ml: 90 días tras su apertura (P).	

PERÍODO DE VALIDEZ DE FORMAS FARMACÉUTICAS OFTÁLMICAS TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal¹, Natividad Rivas García¹ y Coral Lomba Brandón¹
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6740811	DORZOLAMIDA ARISTO	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
6851814	DORZOLAMIDA/TIMOLOL AUROVITAS	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
7019008	DORZOLAMIDA/TIMOLOL MEIJI	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
6833605	DORZOLAMIDA/TIMOLOL STADA	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
6839058	DORZOLAMIDA/TIMOLOL VIATRIS	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
6975312	DORZOLAMIDA/TIMOLOL VIR	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
7289333	DUCRESSA	1 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
7038283	DUOKOPT	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.		2 meses tras su apertura (P).	
6544020	DUOTRAV	40 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml (PP)	40 µg/ml=0,004% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7283331	ECBIRIO	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	90 días tras su apertura (P).	
7593249	ELEBLOC	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
7536086	EMADINE	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7270607	ETACORTILEN	1,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,3 ml	1,5 mg/ml=0,15%	No congelador.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7736141	EXOCIN	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
7239444	FIXAPROST	50 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 ENVASES 0,2 ml	50 µg/ml=0,005% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	1 mes tras la apertura del sobre (P).
7233169	FML	1 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	60 días tras su apertura (P).	
7275411	FRIDEX	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	60 días tras su apertura (P).	
7295129	FRIDEX	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.		28 días tras su apertura (P).	
7005698	FUCITHALMIC	10 mg/g GEL OFTALMICO 1 TUBO 5 g	10 mg/g=1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Desechar el envase una vez finalizado el tratamiento (P).	
6545614	GANFORT	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
6993286	GANFORT	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz y humedad.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6501962	HIDRATHEA	9 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	9 mg/ml=0,9%	No congelador.		8 semanas tras su apertura (P).	
7017103	HIPROMELOSA QUALIGEN	3,2 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,5 ml	3,2 mg/ml=0,32%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7079668	IKERVIS	1 mg/ml COLIRIO EN EMULSION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6873359	IOPIMAX	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7354727	ISOPTO B12	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador.		1 mes tras su apertura (P).	

PERÍODO DE VALIDEZ DE FORMAS FARMACÉUTICAS OFTÁLMICAS TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal¹, Natividad Rivas García¹ y Coral Lomba Brandón¹
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
9578787	ISOPTO FLUCON	1 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7303350	KETISAL	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0,25mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	3 meses tras su apertura (P).	
6970805	KETOBRIILL	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,4 ml	0,25mg/ml=0,025%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	4 semanas tras la apertura del sobre (P).
6794371	KETOTIFENO FARMALIDER	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,25mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6814529	LACRYVISC	3 mg/g GEL OFTALMICO 1 TUBO 10 g	3 mg/g=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7016175	LAGROBEN	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0.5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6732250	LATANOPROST AUROVITAS	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6861073	LATANOPROST COMBIX	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6848906	LATANOPROST QUALIGEN	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6721407	LATANOPROST RATIOPHARM	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6647950	LATANOPROST STADA	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6648162	LATANOPROST VIATRIS	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6888742	LATANOPROST VIR	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7013709	LATANOPROST/TIMOLOL RAFARM	50 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005% + 5 mg/ml=0,5%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6847107	LATANOPROST/TIMOLOL STADA	50 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005% + 5 mg/ml=0,5%	Nevera. No congelador.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7337331	LIFOG	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Frasco 2,5ml 30 días tras su apertura. Frasco de 7,5ml: 90 días tras su apertura (P).	
7641186	LIPOLASIC	2 mg/g GEL OFTÁLMICO 1 TUBO 10 g	2 mg/g=0,2%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	Es importante mantener el tubo tan limpio como sea posible durante su uso (P).
6657478	LUMIGAN	0,1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,1 mg/ml=0,01%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6976487	LUMIGAN	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	0,3 mg/ml=0,03%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	30 días tras la apertura del sobre (P).
7609773	LUMOBRY	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0,25 mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	121 días tras su apertura (P).	
6535028	MAXIDEX	1 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
7842156	MAXITROL	3500 UI/ml + 6000 UI/ml + 1 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml		No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7274292	MINIMS FENILEFRINA HIDROCLORURO	100 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,5 ml	100 mg/ml=10%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7161202	MINIMS FLUORESCINA SODICA	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6942246	MIRAZUL	1,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	1,25 mg/ml=0,125%	No congelador. Proteger de luz.		1 mes tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6936986	MONOPROST	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,2 ml	50 µg/ml=0,005%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	10 días tras la apertura del sobre (P).
6640104	MYDRIASERT	0,28 mg/5,4 mg 1 INSERTO OFTALMICO		No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
7943051	NAAXIA	38 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	38 mg/ml=3,8%	No congelador.		3 meses tras su apertura (P).	
7282396	NETDEX	3 mg/ml + 1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,3 ml	3 mg/ml=0,3% + 1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7282402	NETDEX	3 mg/ml + 1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3% + 1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
7299356	NETDEX	3 mg/ml + 1 mg/ml GEL OFTALMICO 15 MONODOSIS 0,4 ml	3 mg/ml=0,3% + 1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).
7282037	NETENAX	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
7282044	NETENAX	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 15 ENVASES MONODOSIS 0,3 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6880456	NEVANAC	1 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7043720	NEVANAC	3 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 3 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7552154	OCULOTECT	50 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	50 mg/ml=5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7552239	OCULOTECT	50 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,4 ml	50 mg/ml=5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6641675	OFARSIN	2 mg/g GEL OFTALMICO 30 MONODOSIS 0,6 g	2 mg/g=0,2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7114758	OFLOXACINO POS	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6878309	OFTACIOX	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7836056	OFTACIOX	3 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3,5 g	3 mg/g=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
9904739	OFTALMOLOSA CUSI ANTIEDEMA	50 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 5 g	50 mg/g=5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6535202	OFTALMOLOSA CUSI AUREOMICINA	5 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3 g	5 mg/g =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6720882	OFTALMOLOSA CUSI CLORAMFENICOL	10 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3 g	10 mg/g=1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7976394	OFTALMOLOSA CUSI DE ICOL	0,5 mg/g + 10 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3 g	0,5 mg/g=0,05% + 10 mg/g=1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (CE).	
6720875	OFTALMOLOSA CUSI DEXAMETASONA	0,5 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3 g	0,5 mg/g=0,05%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
6535288	OFTALMOLOSA CUSI ERITROMICINA	5 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3,5 g	5 mg/g =0,5%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
6535363	OFTALMOLOSA CUSI GENTAMICINA	3 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 5 g	3 mg/g=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6535400	OFTALMOLOSA CUSI HIDROCORTISONA	15 mg/g POMADA OFTALMICA 1 TUBO 3 g	15 mg/g=1,5%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7977469	OFTALMOLOSA CUSI PREDNISONA NEOMICINA	5 mg/g + 3,5 mg/g POMADA OFTÁLMICA 1 TUBO 3 g	5 mg/g=0,5% + 3,5 mg/g=0,35%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (CE).	
6526781	OFTALMOWELL	25 UI/ML + 1.700 UI/ML + 5.000 UI/ML COLIRIO 1 FRASCO 5 ML		No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
9627201	OJOSBEL	0,3 mg/ml + 0,08 ml/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 8 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 0,08=0,008 ml/ml	No congelador. Proteger de luz.		1 mes tras su apertura (P).	
9627386	OJOSBEL	0,3 mg/ml + 0,08 ml/ml COLIRIO EN SOLUCION 10 MONODOSIS 0,5 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 0,08=0,008 ml/ml	No congelador. Proteger de luz.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (CE).	
7656449	OPATANOL	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
7266754	OPHTESIC	20 mg/g GEL OFTÁLMICO 20 TUBOS UNIDOSIS 3,5 g	20 mg/g=2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7148999	OPTALERG	5 mg/ml + 0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	5 mg/ml=0,5% + 0,25 mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	30 días tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6978061	OPTISPRING	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	0.5 mg/ml=0,05%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	30 días tras su apertura (P).	
6978078	OPTISPRING	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 10 MONODOSIS 0,5 ml	0.5 mg/ml=0,05%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6610589	PRED FORTE	10 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6820964	REACTINE LEVOCABASTINA	0,5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 4 ml	0.5 mg/ml=0,05%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7114246	RELESTAT	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6614761	SAFLUTAN	1,5 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1,5 µg/ml=0,0015%	Nevera. No congelador.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).
6515167	SICCAFLUID	2,5 mg/g GEL OFTALMICO 30 MONODOSIS 0,5 g	2,5 mg/g=0,25%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6515174	SICCAFLUID	2,5 mg/g GEL OFTALMICO 60 MONODOSIS 0,5 g	2,5 mg/g=0,25%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
6591444	SICCAFLUID	2,5 mg/g GEL OFTALMICO 1 TUBO 10 g	2,5 mg/g=0,25%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	Guardar el frasco en posición vertical, con el tapón hacia abajo, con el fin de facilitar la formación de gotas para la próxima vez que lo use (P).
7034834	SIMBRINZA	10 mg/ml + 2 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	10 mg/ml=1% + 2 mg/ml=0,2%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7199830	SINETRAV	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
7188360	SOFTACORT	3,35 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	3,35 mg/ml=0,335%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	1 mes tras la apertura del sobre (P).
7218326	TAFLOTAN	1,5 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	1,5 µg/ml=0,0015%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	3 meses tras su apertura (P).	
7627043	TANOLUX	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C una vez abierto (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).
7070627	TAPTIQOM	1,5 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,3 ml	1,5 µg/ml=0,0015% + 5 mg/ml =0,5%	Nevera. No congelador.	Conservar a temperatura <30°C una vez abierto (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7300182	TAPTIQOM	15 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	15 µg/ml=0,0015% + 5 mg/ml =0,5%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	Frasco 3ml: 1 mes tras su apertura. Frasco 5ml: 2 meses tras su apertura. Frasco 7ml: 3 meses tras su apertura (P).	
6960523	TEBARAT	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,25 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz y humedad.		12 horas tras su apertura (P).	3 meses tras la apertura del sobre (P).
7287469	TEBARAT	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 40 MONODOSIS 0,25 ml	0,5 mg/ml=0,05%	No congelador. Proteger de luz y humedad.		12 horas tras su apertura (P).	3 meses tras la apertura del sobre (P).
7007050	TERRAMICINA	10 mg/g POMADA OFTÁLMICA 1 TUBO 3,5 g	10 mg/g=1%	No congelador.	Mantener preferentemente entre 15°C y 30°C (P).	Desechar el envase una vez finalizado el tratamiento (P).	
7580546	TIDIMAZ	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Frasco 5ml: 60 días tras su apertura. Frasco 10ml: 90 días tras su apertura (P).	
6856284	TILAVIST	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
7173892	TIMABAK	2,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2,5 mg/ml=0,25%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	8 semanas tras su apertura (P).	
7174967	TIMABAK	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	8 semanas tras su apertura (P).	
7247869	TIMOFTOL	2,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	2,5 mg/ml=0,25%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7247876	TIMOFTOL	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
9432744	TIMOFTOL	2,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	2,5 mg/ml=0,25%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6682937	TIMOLOL SANDOZ EFG	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6683019	TIMOLOL SANDOZ EFG	2,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	2,5 mg/ml=0,25%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6727225	TOBRABACT	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	15 días tras su apertura (P).	
7006459	TOBRADEX	1 mg/ml + 3 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1% + 3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6535448	TOBEX	3 mg/g UNGUENTO OFTALMICO 1 TUBO 3,5 g	3 mg/g=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
9772987	TOBEX	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6503522	TOBEXAN	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 4 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7310969	TRAGLASIN	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,2 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	30 días tras la apertura del sobre (P).
9598174	TRAVATAN	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
7039259	TRAVOPROST STADA	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador. Proteger de luz y humedad.		4 semanas tras su apertura (P).	
7168324	TRAVOPROST/TIMOLOL STADA	40 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	40 µg/ml=0,004% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.		4 semanas tras su apertura (P).	
6867259	TRUSOPT	20 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	20 mg/ml=2%	No congelador. Proteger de luz.		28 días tras su apertura (P).	
6986707	URSITAN	3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,25 ml	3 mg/ml=0,3%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	90 días tras la apertura del sobre (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6641538	VIGAMOX	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
6522257	VIRGAN	1,5 mg/g GEL OFTALMICO 1 TUBO 5 g	1,5 mg/g=0,15%	No congelador.		4 semanas tras su apertura (P).	
8186587	VISCOFRESH	10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	10 mg/ml=1%	No congelador. Proteger de luz y humedad.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (CE).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
8764587	VISCOFRESH	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 10 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
8764662	VISCOFRESH	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6825426	VISCOTEARS	2 mg/g GEL OFTALMICO 1 TUBO 10 g	2 mg/g=0,2%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7030836	VISKERN	5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,4 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.		Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
6594261	VISPRING	500 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 10 MONODOSIS 0,5 ml	500 µg/ml=50%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7306603	VISPRING	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	5 mg/ml =0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	6 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el envase está deteriorado. No utilice este medicamento si observa que la solución cambia de color o se enturbia (P).
7323402	VISUBLEND	0,3 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
7320630	VISUCOPT	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 ENVASES MONODOSIS 0,166 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	7 días tras la apertura del sobre (P).

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
7604273	VISUCOPT	20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 60 ENVASES MONODOSIS 0,166 ml	20 mg/ml=2% + 5 mg/ml=0,5%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	7 días tras la apertura del sobre (P).
7316473	VISUTRAX	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,1 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	7 días tras la apertura del sobre (P).
7315414	VIVIDRIN	0,5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,6 ml	0.5 mg/ml=0,05%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	
7168782	VIZIBIM	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0.3 mg/ml=0,03%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7152583	VIZITRAY	40 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	40 µg/ml=0,004%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	No utilizar si el cierre está deteriorado (P).
7120346	VOLTAREN	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 10 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).
7645559	VOLTAREN	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <30°C (P).	28 días tras su apertura (P).	
8235919	VOLTAREN	1 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 40 MONODOSIS 0,3 ml	1 mg/ml=0,1%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	28 días tras la apertura del sobre (P).
9750602	XALACOM	50 µg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005% + 5 mg/ml=0,5%	Nevera. No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	4 semanas tras su apertura (P).	Una vez abierto el frasco, no es necesario guardarlo en la nevera, pero no lo ponga a temperatura superior a 25°C (P).
6664872	XALATAN	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 2,5 ml	50 µg/ml=0,005%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7315858	XIOP	50 µg/ml COLIRIO EN SOLUCION 30 MONODOSIS 0,2 ml	50 µg/ml=0,005%	Nevera. No congelador.	Conservar a temperatura <25°C una vez abierto (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	7 días tras la apertura del sobre (P).
7278535	XOROX	30 mg/g POMADA OFTÁLMICA 1 TUBO 4,5 g	30 mg/g=3%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	

PERÍODO DE VALIDEZ DE FORMAS FARMACÉUTICAS OFTÁLMICAS TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal¹, Natividad Rivas García¹ y Coral Lomba Brandón¹
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Código nacional	Nombre	Descripción	Composición en Porcentaje	Conservación:	Temperatura de conservación	Caducidad del envase abierto	Notas
6848746	YELLOX	0,9 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,9 mg/ml=0,09%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
6775752	ZADITEN	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 20 MONODOSIS 0,4 ml	0,25 mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	Utilizar inmediatamente y desechar el envase unidosis después de su uso (P).	3 meses tras la apertura del sobre si se guardan en el embalaje externo de cartón, o de no ser así, durante 4 semanas (P).
6779897	ZADITEN	0,25 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 5 ml	0,25 mg/ml=0,025%	No congelador.	Conservar a temperatura <25°C (P).	4 semanas tras su apertura (P).	
7269243	ZIMED	0,3 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 FRASCO 3 ml	0,3 mg/ml=0,03%	No congelador. Proteger de luz.	Conservar a temperatura <25°C (P).	28 días tras su apertura (P).	